

国产龙脑香科一新种

陶国达 张建侯
(中国科学院云南热带植物研究所)

A NEW SPECIES OF DIPTEROCARPACEAE FROM CHINA

Tao Gouda and Zhang Jianhou
(Yunnan Institute of Tropical Botany, Academia Sinica)

版纳青梅 新种 图 1

Vatica xishuangbannaensis G.
D. Tao et J. H. Zhang, sp. nov.

Species *V. fleuryana* Tardieu affinis sed differt foliis nervis lateralibus 12—14-jugis, apice acuminatis; filamentis antheris aequantibus, basi dilatatis, antheris apice obtusis differt.

Arbor sempervirens 34—40 m alta, trunco 40—90 cm in diametro; cortex griseus. Folia subcoriacea, oblongo-lanceolata, 9—19 cm longa, 2.5—5 cm lata, apice acuminata basi rotundata vel late cuneata, margine integra, praeter costam utringue pilis stellatis sparse oblecta ceterum glabran, nervis lateralibus 12—14-jugis utrinque elveatis; petiolis 1.5—2 cm longis, dense fulvo-stellato-pubescentibus. Inflor-esc-entae paniculatae terminales vel




图 1 版纳青梅 *Vatica xishuangbannaensis* G. D. Tao et J. H. Zhang, sp. nov. 1.花枝; 2.叶; 3.花; 4.花萼上的星状毛; 5.花萼及雌花; 6.柱头; 7.雄蕊腹面和背面; 8.果。(曾孝谦绘)

axillares, 5—12 cm longae fulvo-pubescentes et stellato-pilosae; sepalia inaequales, valvata utrinque dense argenteo vel fulvo-pubescentes; petala 5, alba vel rubella, oblonga, 1.5 cm longa, 5 mm lata exterioria dimidiodense griseo-pubescentia, intus glabra; stamina 15, biserialim disposita, 5 interiora, 10 exteriora; filamenta antheris subaequilonga, basi dilatata, antherae apice obtusae; ovarium subglobosum, argenteo vel fulvo-pubescens et stellat-pilosum, stylus 2 mm longus glaber, stigmatibus 3-lobatis. Fructus subglobosus, stellato-pubescens; calycis lobis duobus majoribus oblongis 3—4 cm longis, 1—1.5 latis, utrinque stellato-pilosus, apice rotundatis 5-nervibus, semen 1.

Yunnan: Meng-la Xian alt. 800 m. May. 10. 1982. Tao Gou-da 32072 (Typus! in YNTBI).

常绿乔木，高35—40米，胸径40—90厘米；树皮灰白色至灰黑色。叶近革质，长圆状披针形，长9—19厘米，宽2.5—5厘米，先端渐尖，基部阔楔形，侧脉12—14对，两面均突起，全缘，除中脉具疏星状柔毛外，其余无毛；叶柄长1.5—2厘米，密被棕褐色的星状绒毛。圆锥花序顶生或腋生，长5—12厘米，密被黄色星状短绒毛。花萼裂片5枚，镊合状排列，大小略不等，两面密被银灰色至灰黄色的星状毛；花瓣5枚，白色或微红色，长圆形，长1.5厘米，宽5毫米，先端浑圆，外面一半（蕾时裸露部分）被星状绒毛，里面无毛。雄蕊15枚，两轮排列，内轮5枚，外轮10枚；花丝与花药近等长，花丝基部扩大；花药顶部钝。子房近球形，3室，密被灰黄色的星状绒毛；花柱长约2毫米，略具棱，无毛；柱头3浅裂，裂片上具齿缺。果实近球形，被星状绒毛；宿存萼片5枚，2枚增大成长圆状披针形的翅，长3—4厘米，宽1—1.5厘米，两面被疏星状柔毛，先端浑圆，具纵脉5条，其余3枚披针形，长1.5—2厘米，宽5毫米，无毛，具纵脉5条。种子1枚。花期5—6月，果期7—8月。

云南：勐腊县，南沙河，海拔800米，林中潮湿，乔木，花白色微红色，芳香。1982年5月10日，陶国达32072（模式标本存中国科学院云南热带植物研究所标本室）。

此种近于 *V. fleuryana* Tardieu, 不同点为：叶脉12—14对；先端渐尖；花丝与花药等长，基部扩大；花药顶部钝而易区别。